

**FORMULÁRIO PADRÃO PARA INDICAÇÃO DE VACINA COVID-19**

CPF: _____ . _____ . _____ - _____	CELULAR: ( ) _____
NOME (PACIENTE):	
MÃE:	SEXO: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
D.N.: ____ / ____ / ____	IDADE:
END.:	Nº
BAIRRO:	COMPLEMENTO:
LOCAL DO PRONT (UNIDADE/CONSULTÓRIO):	

**COMORBIDADES PRIORITÁRIAS PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19**

- ✓ Assinale a comorbidade, conforme acompanhamento Prontuario Médico;
- ✓ No final do formulário, informar o C.I.D. principal, além de Datar, Assinar e Carimbar (carimbo com NOME COMPLETO e NÚMERO de registro do CREMESP);
- ✓ Este formulário também pode ser utilizado para versões eletrônicas com assinatura digital.

- DIABETES MELLITUS - Qualquer indivíduo com diabetes.
- PNEUMOPATIAS CRÔNICAS GRAVES - Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática).
- HIPERTENSÃO ARTERIAL RESISTENTE (HAR) - Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos.
- HIPERTENSÃO ARTERIAL ESTÁGIO 3 - PA sistólica  $\geq$  180mmHg e /ou diastólica  $\geq$  110mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade.
- HIPERTENSÃO ARTERIAL ESTÁGIOS 1 E 2 COM LESÃO EM ÓRGÃO-ALVO E/OU COMORBIDADE - PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade.
- INSUFICIÊNCIA CARDÍACA (IC) - IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association.
- COR-PULMONALE E HIPERTENSÃO PULMONAR - Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária.
- CARDIOPATIA HIPERTENSIVA - Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo).
- SÍNDROMES CORONARIANAS - Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós-infarto agudo do miocárdio, outras).
- VALVOPATIAS - Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras).
- MIOCARDIOPATIA SEPERICARDIOPATIAS - Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática.

- DOENÇAS DA AORTA, DOS GRANDES VASOS E FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS - Aneurismas, disseccções, hematomas da aorta e demais grandes vasos.
- ARRITMIAS CARDÍACAS - Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras).
- CARDIOPATIAS CONGÊNITA NO ADULTO - Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico.
- PRÓTESES VALVARES E DISPOSITIVOS CARDÍACOS IMPLANTADOS- Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência).
- DOENÇA CEREBROVASCULAR - Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular.
- DOENÇA RENAL CRÔNICA - Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>) e/ou síndrome nefrótica.
- IMUNOSSUPRIMIDOS - Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossuppressores ou com imunodeficiências primárias
- PACIENTES ONCOLÓGICOS - Pessoas que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos ÚLTIMOS 6 meses; neoplasias hematológicas.
- HEMOGLOBINOPATIAS GRAVES- Doença falciforme e talassemia maior.
- OBESIDADE MÓRBIDA- Índice de massa corpórea (IMC)  $\geq$  40 kg/m<sup>2</sup>.
- SÍNDROME DE DOWN- Trissomia do cromossomo 21.
- CIRROSE HEPÁTICA - Cirrose hepática Child-Pugh A, Bou C.
- DEFICIÊNCIA FÍSICA PERMANENTE – (Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas / grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo / grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos / Deficiência intelectual permanente que limite suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.).

**DATA:**

**C.I.D.:**

\_\_\_\_\_  
NOME COMPLETO DO MEDICO / CRM / ASSINATURA / CARIMBO